

Gebrauchsinformation



Lesen Sie sorgfältig die Packungsbeilage, bevor Sie mit der Enterosgel®-Einnahme beginnen.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht wollen Sie diese später nochmals lesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Enterosgel® und wofür wird es angewendet?

Enterosgel® ist ein innovatives intestinales Adsorbtionsmittel (Enterosorbent), das zur Bindung von Toxinen, Schadstoffen, pathogenen Bakterien und Allergenen im Magen-Darm-Trakt und zu ihrer Ausscheidung aus dem Körper dient.

Klinische Wirkung von Enterosgel®:

- entschärft bzw. verhindert toxische und allergische Reaktionen;
- hilft, Durchfall zu bekämpfen bzw. seine Dauer zu verkürzen;
- lindert Symptome von Verdauungsstörungen (Dyspepsie);
- beschleunigt den Abbau von Alkohol im Körper;
- hilft beim Aufbauen einer gesunden Darmflora;
- schützt die Schleimhaut im Magen-Darm-Trakt und befördert die Heilung bei Schleimhautverletzungen;
- reduziert die toxische Belastung von Leber und Nieren.

Enterosgel® wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern bei:

- akutem Durchfall von unterschiedlichen Ursachen: bakteriell, viral (u.a. Rotavirusinfektion), alimentäre Toxikoinfektion, Antibiotika-assoziierte Diarrhö, Reizdarmsyndrom und andere;
- chronischer Diarrhö von unterschiedlichen Ursachen (Malabsorption-Syndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen u.a.);
- Dyspepsie;
- Störungen der Darmflora (zum Beispiel wegen Antibiotika-Anwendung);
- Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür;
- Vergiftungen, darunter Alkohol- und Drogenintoxikation;
- chronischen Leber- und Nierenerkrankungen mit Insuffizienz;

- allergischen Erkrankungen (Bronchialasthma, Nahrungsmittelallergie, Nesselskrankheit u.a.);
- Hauterkrankungen (atopische Dermatitis, Ekzem, Acne vulgaris);
- Gestose.

Enterosgel® wird angewendet bei gesunden Menschen zur:

- Vorbeugung gegen Atherosklerose und koronare Herzkrankheit (Senkung des Cholesterinspiegels im Serum);
- Vorbeugung gegen chronische Intoxikationen bei Menschen, die in Gebieten mit verschmutzter Umwelt leben oder die im gesundheitsschädigendem Millieu arbeiten (hilft Radionuklide oder Schwermetallsalze aus dem Körper auszuschleiden);
- präventiven Entgiftung des Organismus.

Enterosgel® fördert die Widerstandsfähigkeit des Körpers und die allgemeine Genesung. Enterosgel® wird nicht absorbiert sondern binnen 12 Stunden nach der Einnahme aus dem Körper ausgeschieden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Enterosgel® beachten?

Enterosgel® darf nicht eingenommen werden, wenn Sie an Darmatonie leiden. Informieren Sie Ihren Arzt, dass Sie dieses Mittel einnehmen.

Kinder: Bei Einnahme von Enterosgel® ist Risikolosigkeit und Wirksamkeit nachgewiesen. Sie können Enterosgel® Kindern gemäß Vorgabe in Punkt 3 verabreichen.

3. Wie ist Enterosgel® einzunehmen?

Es wird empfohlen, Enterosgel® schon bei den ersten Anzeichen von Krankheit anzuwenden.

Enterosgel® ist 1 bis 2 Stunden vor oder nach der Mahlzeit peroral einzunehmen. Das Präparat mit reichlich Flüssigkeit einnehmen oder in halbem Glas Wasser vermischt eingeben.


Altersgemäße Standarddosierung

Erwachsene:

15 g (1 Beutel oder 1 Esslöffel) 3-mal pro Tag (45 g/Tag).

Kinder:

- ab 5 Jahren: 10–15 g (2 bis 3 Teelöffel) 3-mal pro Tag (30 bis 45 g/Tag);
- ab 1 Jahr bis 5 Jahre: 5–10 g (1 bis 2 Teelöffel) 3-mal pro Tag (15 bis 30 g/Tag);



- unter 1 Jahr: 1,7 g (1/3 Teelöffel) vor dem Stillen, bis 6 Mal pro Tag (bis 10 g/Tag). Vor der Einnahme kann die Einzeldosis von Enterosgel® mit Muttermilch, Wasser, Saft oder mit halbflüssiger Säuglingsnahrung (in Proportion 1:3) vermischt werden.

Akuter Durchfall

Erste Einnahme: 2 Standardeinzeldosen, weiter 1 Standardeinzeldosis nach jedem Stuhlgang. Nach der Durchfalleinstellung wird die Einnahme von Enterosgel® noch weitere 5 Tage lang in der Standarddosierung empfohlen.

Schwere Vergiftungen und Intoxikationen

Standardeinzeldosis kann die ersten drei Tage lang verdoppelt werden.

Vorbeugung gegen Atherosklerose und koronare Herzkrankheit

Erwachsene: 1 Standardeinzeldosis 3-mal pro Tag 4–6 Wochen lang.

Vorbeugung gegen chronische Intoxikationen bei Menschen, die in Gebieten mit verschmutzter Umwelt leben oder die in gesundheitsschädlichem Millieu arbeiten.

2 Standardeinzeldosen pro Tag oder 1 Einzeldosis 2-mal pro Tag 7–10 Tage lang monatlich.

Präventive Organismusreinigung

1 Standarddosierung 3-mal pro Tag 10–14 Tage lang. Es wird empfohlen, die Reinigungskur 3–6-mal pro Jahr durchzuführen.

Behandlungsempfehlungen

Bei akuter Vergiftung wird empfohlen, Enterosgel® 3–5 Tage lang einzunehmen.

Bei chronischer Intoxikation und allergischen Erkrankungen wird empfohlen, Enterosgel® 2–3 Wochen lang einzunehmen.

4. Wenn ich die Einnahme von Enterosgel® vergessen habe?

Bleiben Sie bitte ruhig und setzen Sie die Einnahme von Enterosgel® fort.

5. Kontraindikationen

Darmatonie.

6. Welche Nebenwirkungen sind bei der Einnahme von Enterosgel® möglich?

Sehr selten kommen Übelkeit oder Obstipation (Verstopfung) vor.

7. Schwangerschaft und Stillzeit.

Enterosgel® kann während der Schwangerschaft und der Stillzeit eingenommen werden.

8. Bei Einnahme von Enterosgel® mit anderen Arzneimitteln.

Es gibt keine Angaben über Beeinträchtigung therapeutischer Wirksamkeit von Arzneimitteln, die gleichzeitig mit Enterosgel® eingenommen werden.

9. Wenn ich eine größere Menge von Enterosgel® eingenommen habe, als ich sollte.

Es sind keine Symptome von Überdosierung bei diesem Medizinprodukt bekannt. Patienten (inklusive Kleinkinder) vertragen Enterosgel® auch in höheren Dosen gut.

10. Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es wurden keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beobachtet.

11. Weitere Informationen

Inhaltsstoffe:

Polymethylsiloxan Polyhydrat (Methylkieselsäure-Hydrogel) – 70 %, gereinigtes Wasser – 30 %.

Enterosgel® ist frei von Süßungsmitteln, Farbstoffen, Fetten, Geschmackverstärkern und Konservierungsmitteln sowie zuckerfrei, laktosefrei und glutenfrei.

Verpackung:

Orale Suspension, Tube 90 g, 225 g, Beutel 15 g (2, 10, 30 Beutel in einer Packung).

Hinweis:

Beim Ausdrücken des Enterosgels kann aus der Tube ein wenig Flüssigkeit austreten.

Lagerungsbedingungen:

Bei Temperaturen zwischen 4–25 °C aufbewahren. Enterosgel® außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Nach Öffnen der Packung Austrocknen vermeiden. Vor Frost schützen! Nach Öffnen der Packung innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen.

Haltbarkeitsdauer:

3 Jahre. Nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Was sollen Sie machen, wenn die Packung beschädigt ist?

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Packung beschädigt ist.



Hersteller:



Bioline Products s.r.o., Krakovska 1338/10,
110 00 Prag 1, Tschechische Republik
Tel./fax: +420 266 317 783
e-mail: info@enterosgel.eu
www.enterosgel.eu

**Letzte Aktualisierung der
Gebrauchsinformation: 2-07/2014.**

Nützliche Informationen zum Wirkungsmechanismus von Enterosgel®

Der Magen-Darm-Trakt spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit:

- er versorgt den Körper mit den notwendigen Nährstoffen;
- er ist einer der Wege, auf dem Schadstoffe und Toxine aus dem Körper ausgeschieden werden;
- er bildet Barrieren und fördert die Immunität.

Ursachen von Gesundheitsstörungen und Symptomen

Intensives Eindringen von Infektions-Erregern, Toxinen, Allergenen und Xenobiotika (Pestizide, Radionuklide, Schwermetallsalze u. ä.) in den Magen-Darm-Trakt führt zur Entwicklung von Magen-Darm-Infektionen, Vergiftungen und allergischen Reaktionen.

Im Organismus bilden sich ständig schädliche und toxische Metaboliten. Ein Teil dieser Stoffe gerät in den Darm und wird in der Regel zusammen mit dem Stuhl ausgeschieden, aber einige Schadstoffe können zurück in den Blutkreislauf gelangen und somit in die Leber und bleiben im enterohepatischem Kreislauf zurück.

Die häufigsten Symptome von akuter Intoxikation sind allgemeine Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, allergische Erscheinungen und erhöhte Körpertemperatur.

Bei dauernder Einwirkung von geringen Konzentrationen endogener und exogener Toxine entwickelt sich eine chronische Intoxikation, die sich hinter anderen Erkrankungen verbergen kann, zum Beispiel dem chronischen Erschöpfungssyndrom oder Anämie.

Notwendige Maßnahmen

Ein wichtiger Schritt zur Genesung, optimalen Gesundheit und hohem Alter ist die Beseitigung von Toxinen und pathogenen Mikroorganismen aus dem Magen-Darm-Trakt. Enterosgel® führt Toxine aus dem Organismus hinaus und fördert die Gesundheit.

Enterosgel®

Der aktive Wirkstoff von Enterosgel® ist eine polymere organische Siliziumverbindung – Polymethylsiloxan Polyhydrat (Methylkieselsäure-Hydrogel). Es hat eine Porenstruktur und Gel-artige Konsistenz.

Enterosgel® hat eine selektive Absorptionsfähigkeit, die auf seine bestimmte voreingestellte Porengröße zurückzuführen ist. Das ermöglicht, dass Enterosgel® an seiner Oberfläche Schadstoffe, nicht aber nützliche Stoffe bindet. Selektive Entgiftung führt zur schnellen Besserung des Allgemeinbefindens, zur Normalisierung der Verdauung sowie Erhöhung der Infektionsresistenz und verhilft dem Organismus zur optimalen Funktion.


Dank seiner einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften wird Enterosgel® vom Körper nicht absorbiert. Das Präparat bedeckt die Magen- und Darmschleimhaut, schützt sie vor Reizstoffen, stellt das Epithelgewebe wieder her und fördert das Heilen von Geschwüren und Erosionen.

Enterosgel® bindet hoch effektiv pathogene Bakterien und ihre Toxine sowie auch Rotaviren. Infolgedessen schafft es Bedingungen für das Wachstum der normalen Darmflora und für die Wiederherstellung der lokalen Immunität.

Enterosgel® absorbiert keine Nährstoffe (inklusive Vitamine, Kalzium und weitere Mineralien), darum empfehlen wir dieses Darm-Adsorptionsmittel in folgenden Fällen:

- Syndrom der Resorptionsstörung und andere chronische Verdauungsstörungen;
- Schwangerschaft und Kindesalter (Wachstumsperiode);
- Ernährungsmangel;
- Perioden von intensiven Körperbelastungen;
- während der Chemotherapie und Strahlentherapie;
- chronische Leber- und Niereninsuffizienz.

Enterosgel® hat ein hohes Sicherheitsniveau und kann auch im Kindesalter, während der Schwangerschaft und der Stillzeit eingenommen werden.



Medizinprodukt  1023